

Matematica

4. Funzioni potenza, equazioni e disequazioni irrazionali

Giuseppe Vittucci Marzetti¹

Corso di laurea in Scienze dell'Organizzazione
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi di Milano-Bicocca

A.A. 2019-20

¹Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126, Milano, E-mail: giuseppe.vittucci@unimib.it

Layout

1 Funzioni potenza

- Richiami sulle potenze
- Definizione di funzione potenza
- Funzioni potenza con esponente intero positivo
- Funzioni potenza con esponente frazionario positivo

2 Equazioni irrazionali

- Definizione di equazione irrazionale
- Equazioni irrazionali con radice di indice pari
- Equazioni irrazionali con radice di indice dispari
- Equazioni irrazionali con più radici

3 Diseguazioni irrazionali

- Diseguazioni irrazionali con radice ad indice pari
- Diseguazioni irrazionali con radice ad indice dispari

Richiami sulle potenze

- Se a è un numero reale e m un naturale maggiore o uguale a 2, si definisce **potenza di base a** ed **esponente m** il numero:

$$a^m = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m\text{-volte}}$$

- Se $m = 1$ si pone per definizione: $a^1 = a$.
- Se $m = 0$ e $a \neq 0$ si pone per definizione: $a^0 = 1$.
- 0^0 è invece indefinito.
- La definizione di potenza si estende per consentire:
 - esponenti interi negativi** con base diversa da zero:

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}, \quad a \neq 0$$

- esponenti frazionari**, cioè del tipo m/n , con n numero naturale maggiore di 1:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \quad a > 0; \quad 0^{\frac{m}{n}} = 0, \quad \frac{m}{n} > 0$$

Proprietà delle potenze

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^m \cdot a^{-n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$a^n \cdot b^n = (a b)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

Funzioni potenza

- Si chiamano **funzioni potenza** le funzioni del tipo:

$$f(x) = x^n$$

- se $n \in \mathbb{N}$ e $n > 0$ (esponente intero e positivo), il dominio è \mathbb{R} .
- se $n \in \mathbb{Z}$ e $n < 0$, il dominio è $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- negli altri casi, il dominio è \mathbb{R}^+ .
- Qualunque sia l'esponente n , il grafico della funzione x^n passa sempre per il punto $(1,1)$.

Funzioni potenza con esponente intero positivo


- I grafici delle **funzioni potenza con esponente intero e positivo**:

$$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}^+$$


sono qualitativamente di due tipi diversi:

- quando n è pari, le funzioni sono **funzioni pari**
(con diagramma simmetrico rispetto all'asse delle ordinate);
- quando n è dispari, le funzioni sono **funzioni dispari**
(con diagramma simmetrico rispetto all'origine degli assi).
- Elementi utili per visualizzare l'andamento delle funzioni:
 - Tutti i grafici passano per il punto $(1,1)$.
 - Nell'intervallo $x \in (0,1)$, il grafico passa al di sotto della bisettrice del primo e terzo quadrante e, all'aumentare di n , si discosta sempre più da essa.
 - Nell'intervallo $x \in (1, +\infty)$, il grafico passa al di sopra della bisettrice del primo e terzo quadrante e, all'aumentare di n , si discosta sempre più da essa.


Esempi di funzioni potenza con esponente intero positivo




(a) $f(x) = x^2$



(b) $f(x) = x^3$



(c) $f(x) = x^4$



(d) $f(x) = x^5$


Funzioni potenza con esponente frazionario positivo

- Le **funzioni potenza con esponente frazionario positivo** sono del tipo:


$$f(x) = x^{\frac{m}{n}}, \quad m, n \in \mathbb{N}^+$$

- Per semplicità ci limitiamo a due casi:
 - $f(x) = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$, che:
 - è definita nei reali solo per $x \geq 0$;
 - è sempre positiva ad eccezione di $f(0) = 0$.
 - $f(x) = x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}$
 - è definita $\forall x \in \mathbb{R}$;
 - è negativa (positiva) se x è positivo (negativo).
- Elementi utili per visualizzare l'andamento delle funzioni:
 - Tutti i grafici passano per il punto $(1,1)$.
 - Nell'intervallo $x \in (0, 1)$, il grafico passa al di sopra della bisettrice del primo e terzo quadrante e, all'aumentare di n , si discosta sempre più da essa.
 - Nell'intervallo $x \in (1, +\infty)$, il grafico passa al di sotto della bisettrice del primo e terzo quadrante e, all'aumentare di n , si discosta sempre più da essa.


Esempi di funzioni potenza con esponente frazionario




(a) $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$



(b) $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$



(c) $f(x) = x^{\frac{1}{4}}$



(d) $f(x) = x^{\frac{1}{5}}$

Equazioni irrazionali

- Le **equazioni irrazionali** sono equazioni individuate da operazioni tra polinomi in cui almeno uno di essi, non costante, è elevato a una potenza con esponente fratto.
- In pratica, nelle equazioni irrazionali l'incognita x compare sotto radice.
- La forma normale di un'equazione irrazionale è del tipo:

$$\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$$

dove $f(x)$ e $g(x)$ sono polinomi.

- È necessario distinguere equazioni irrazionali:
 - con radice di indice pari (n è pari);
 - con radice di indice dispari (n è dispari);
 - con più radici che hanno:
 - lo stesso indice;
 - indice diverso.

Equazioni irrazionali con radice di indice pari

- Forma normale di un'equazione irrazionale:

$$\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$$

dove $f(x)$ e $g(x)$ sono polinomi e n è un **numero pari**.

- Per risolverla occorre:
 - Imporre la **condizione di esistenza**: $f(x) \geq 0$.
 - Imporre la **condizione di concordanza dei segni**: $g(x) \geq 0$
 - Elevare entrambi i membri dell'equazione all'esponente n e risolvere l'equazione: $f(x) = [g(x)]^n$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = [g(x)]^n \end{cases}$$

Equazioni irrazionali con radice di indice dispari

- Forma normale di un'equazione irrazionale:

$$\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$$

dove $f(x)$ e $g(x)$ sono polinomi e n è un **numero dispari**.

- Poiché le potenze con esponente dispari preservano il segno, per risolverla occorre semplicemente elevare entrambi i membri dell'equazione all'esponente n e risolvere l'equazione:

$$f(x) = [g(x)]^n$$

Equazioni irrazionali con più radici

In presenza di un'**equazione irrazionale con più radici** occorre:

- imporre le **condizioni di esistenza**, una per ogni radice con indice pari;
- cercare di isolare le radici in modo che si trovino a destra e a sinistra del segno di uguaglianza, del tipo:

$$\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[m]{g(x)}$$

- se uno o più indici sono pari imporre le **condizioni di concordanza dei segni**.
- elevare i due membri al **minimo comune multiplo degli indici delle radici**.

Disequazioni irrazionali con radice ad indice pari

- Forma normale di una disequazione irrazionale:

$$\sqrt[n]{f(x)} \begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} g(x)$$

dove $f(x)$ e $g(x)$ sono polinomi e n è un **numero pari**.

- Possibili quattro casi:

- 1 **Disequazioni con verso maggiore:** $\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$

$$\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) > [g(x)]^n \end{cases} \cup \begin{cases} g(x) < 0 \\ f(x) \geq 0 \end{cases}$$

- 2 **Disequazioni con verso maggiore o uguale:** $\sqrt[n]{f(x)} \geq g(x)$

$$\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq [g(x)]^n \end{cases} \cup \begin{cases} g(x) < 0 \\ f(x) \geq 0 \end{cases}$$

Diseguazioni irrazionali con radice ad indice pari

- ③ **Diseguazioni con verso minore:** $\sqrt[n]{f(x)} < g(x)$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < [g(x)]^n \end{cases}$$

- ④ **Diseguazioni con verso minore o uguale:** $\sqrt[n]{f(x)} \leq g(x)$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq [g(x)]^n \end{cases}$$

Disequazioni irrazionali con radice ad indice dispari

- Forma normale di una disequazione irrazionale:

$$\sqrt[n]{f(x)} \begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} g(x)$$

dove $f(x)$ e $g(x)$ sono polinomi e n è un **numero dispari**.

- Poiché le potenze con esponente dispari preservano il segno, per risolverla occorre semplicemente elevare entrambi i membri della disequazione all'esponente n e risolvere la disequazione:

$$f(x) \begin{matrix} \leq \\ \geq \end{matrix} [g(x)]^n$$