

## STATISTICA DESCRITTIVA

DATI SINGOLI

DATI RAGGRUPPATI

MEDIA 
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k c_i x_i f(x_i)}{\sum_{i=1}^k f(x_i)}$$

$k = \# \text{ classi}$   
 $i = 1, \dots, k$   
 $f(x_i) = \text{freq. assoluta}$

VARIANZA 
$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k (c_i x_i - \bar{x})^2 f(x_i)$$


$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}{n}}{n-1}$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k x_i^2 f(x_i) - \frac{\left(\sum_{i=1}^k x_i f(x_i)\right)^2}{n}}{n-1}$$

COEFFICIENTE DI VARIAZIONE 
$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100$$

## LA PROBABILITÀ

Dati due eventi A e B



## IL TEST DIAGNOSTICO

$$Sn = P(T^+ | M^+) = \frac{P(T^+ \cap M^+)}{P(M^+)}$$

$$Sp = P(T^- | M^-) = \frac{P(T^- \cap M^-)}{P(M^-)}$$

$$VPP = P(M^+ | T^+) = \frac{P(M^+ \cap T^+)}{P(T^+)}$$

$$VPN = P(M^- | T^-) = \frac{P(M^- \cap T^-)}{P(T^-)}$$

## IL TEOREMA DI BAYES

$$P(M^+ | T^+) = \frac{P(T^+ | M^+) P(M^+)}{P(T^+ | M^+) P(M^+) + P(T^+ | M^-) P(M^-)}$$

## LA DISTRIBUZIONE BINOMIALE

$$P(x | n) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \cdot \pi^x \cdot (1-\pi)^{n-x} =$$

$$= \binom{n}{x} \cdot \pi^x \cdot (1-\pi)^{n-x}$$

## LA DISTRIBUZIONE GAUSSIANA

Data la variabile  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , posso standardizzarla in una  $Z \sim N(0, 1)$

$$z = \frac{(x - \mu)}{\sigma}$$

TEST PER IL CONFRONTO DI UNA MEDIA  
CON UN GOLD STANDARD –  $\sigma$  nota

Test bilaterale

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases} \quad z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{ES(\bar{x})} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad IC : \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

TEST PER IL CONFRONTO DI DUE MEDIE  
 $\sigma_1$  e  $\sigma_2$  note - Test bilaterale

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases} \quad z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{ES(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \quad IC : (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

DIMENSIONE DEL CAMPIONE PER IL CONFRONTO  
TRA DUE MEDIE

$$n = 2(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2 \cdot \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

TEST PER IL CONFRONTO DI UNA MEDIA  
CON UN GOLD STANDARD  
 $\sigma$  non nota - Test bilaterale

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases} \quad t_{n-1} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{ES(\bar{x})} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad IC : \bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

TEST PER IL CONFRONTO DI DUE MEDIE  
 $\sigma_1$  e  $\sigma_2$  non note - Test bilaterale

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases} \quad t_{n_1+n_2-2} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{ES(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p^2 \left[ \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}}$$

$$\text{dove } s_p = \sqrt{\frac{s_1^2(n_1-1) + s_2^2(n_2-1)}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$IC : (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{n_1+n_2-2, \alpha/2} \sqrt{s_p^2 \left[ \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}$$

TEST  $\chi^2$  SULL' ASSOCIAZIONE

$$\begin{cases} H_0 : \text{NON vi è associazione tra due caratteri} \\ H_1 : \text{Vi è associazione tra due caratteri} \end{cases}$$

$$X^2_{(r-1)(c-1)} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - A_{ij})^2}{A_{ij}}$$

Dove:

$r$  è il numero delle righe e  
 $c$  il numero delle colonne di una  
tabella di contingenza

MISURE DI EFFETTO

$$\Delta = p_B - p_A$$

$$NNT = 1/\Delta$$

$$RR = p_B/p_A$$

$$OR = \text{odds}_B / \text{odds}_A$$

TEST PER IL CONFRONTO DI UNA PROPORZIONE  
CON UN GOLD STANDARD - Test bilaterale

$$\begin{cases} H_0 : \pi = \pi_0 \\ H_1 : \pi \neq \pi_0 \end{cases} \quad z = \frac{p - \pi_0}{ES(p)} = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}}$$

$$IC : p \pm z_{\alpha/2} \sqrt{p(1 - p)/n}$$

TEST PER IL CONFRONTO DI DUE PROPORZIONI

$$\begin{cases} H_0 : \pi_1 = \pi_2 \\ H_1 : \pi_2 \neq \pi_2 \end{cases} \quad z = \frac{p_1 - p_2}{ES(p_1 - p_2)} = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p) \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$$\text{dove } p = \frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2}$$

$$IC : (p_1 - p_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$